

Integral Térmica de Lanzarote

Región	Ite	CARACTERIZACION DE WINKLER, Realizada para California
I	< 1.371,80	Las variedades para vino seco de mesa de primera calidad, obtienen aquí su mejor desarrollo. Las de gran desarrollo vegetativo, que soportan una gran carga, no deben plantarse, ya que por su producción no pueden competir con vides plantadas en distritos más cálidos, con suelos fértiles.
II	1.371,80 a 1.649,60	Los valles pueden producir la mayoría de las clases de vinos buenos comunes. Los viñedos menos productivos de las laderas no pueden competir con el cultivo de la uva para vinos comunes, por sus bajos rendimientos, pero sin embargo, pueden producir vinos finos.
III	1.649,60 a 1.926,80	El clima cálido favorece la producción de uva de alto contenido en azúcar, algunas veces con muy poco ácido, como puede ocurrir en las más cálidas. No se producen vinos secos de máxima calidad, ya que los vinos mejor equilibrados pueden obtenerse en las regiones I y II. Pueden producirse excelentes vinos dulces naturales. En los suelos más fértiles pueden producirse buenos vinos comunes.
IV	1.926,80 a 2.204,00	Son posibles los vinos naturales dulces, pero en los años cálidos los frutos de variedades más aceptables tienden a ser de baja acidez. Los vinos blancos comunes y tintos de mesa son satisfactorios si se producen de variedades con acidez alta. Es zona de posible riego.
V	> 2.204,00	Los vinos de mesa blancos y tintos comunes pueden hacerse con variedades de acidez alta. Los vinos para postre pueden ser muy buenos. Es zona de riego.

TEMPERATURA

Integral Térmica Winkler-Amerine

- 0 vegetativo: Temperatura mínima crecimiento
- Grados día: Temperatura media- 0 vegetativo
- Suma de Grados día desde Marzo a Julio. **183 días**

Ej. 0 Vegetativo de la viña es 10°C


1/04 media 9°C grados 0

2/04 media 16°C grados 6

Media de mes, 20°C, $20-10=10 \times 30 = 300$

Integral térmica

Comparativa Integrales diferentes DO



Integral térmica

Integrales Lanzarote Marzo-Julio

